

မိသားစုအတွင်း ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနေရသည်ဟု သံသယလူနာရှိပါက အိမ်တွင်းမှာ သတိပြုစေချင်သည့် အချက် ၈ချက်

အခန်းခွဲထားကြပါစို့

ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အကျဉ်းချုပ် (၂၀၂၁.၃.၁ထုတ်ဝေ)

- ◆ **သီးသန့်အခန်းထားပေးပါ။** အစားစားသည့်အခါ အိပ်သည့်အခါတွင်လည်း အခန်းခွဲထားပါ။
 - ကလေးရှိခြင်း၊ အခန်းနည်းခြင်းကြောင့် အခန်းမခွဲနိုင်ပါက အနည်းဆုံး ၂မီတာ (၂မီတာကျော်)ခွာ၍နေပါ။
 - အခန်း အကန့်ခွဲခြင်းကန်လန်ကာတပ်ဆင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်စေလိုပါသည်။
 - အိပ်စက်သောအခါ မတူညီသောဘက်ကို အပြန်အလှန်ခေါင်းရင်းထားပါ။
- ◆ **ကာယကံရှင်က တတ်နိုင်သမျှအခန်းတွင်းမှအပြင်မထွက်ပါနှင့် ။**
အိမ်သာရေချိုးခန်းစသော ဘုံသုံးနေရာများကိုလည်းအချိန်တိုတိုနှင့် အကြိမ်ရေ နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် အသုံးပြုပါ။

ကူးစက်ခံနေရသူနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကန့်သတ်ထားပါ

- ◆ နှလုံး၊ အဆုတ်၊ ကျောက်ကပ် ရောဂါ အခံရှိသူများ၊ ဆီးချိုရောဂါ အခံရှိသူ၊ ခုခံအားကျဆင်းနေသူများနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူတို့က ရောဂါကူးစက်နေသူကို ပြုစုခြင်းမလုပ်ရ။

Mask တပ်ဆင်ပါ

- ◆ သုံးပြီးသား Maskကို အခြားအခန်းသို့ ယူဆောင်ခြင်းမပြုရပါ။
- ◆ Mask အပြင်မျက်နှာပြင်ကို မကိုင် မထိရအောင် သတိပြုပါ။ Mask ဖြုတ်သည့်အခါ ကြိုးကိုကိုင်၍ ဖြုတ်ပါ။
- ◆ Mask ဖြုတ်ပြီးသွားသောအခါ လက်ကိုဆပ်ပြာဖြင့် စင်ကြယ်စွာဆေးပါ ။
(အယ်လ်ကိုဟော လက်သန့်ပိုးသတ်ဆေးရည်ဖြင့်လည်းရ)
- ※ Mask ညစ်ပေသွားပါက သန့်စင်ခြောက်သွေ့သော Maskဖြင့် ချက်ချင်းလဲပါ
- ※ Mask မပါဘဲ နှာချေချောင်းဆိုးသည့်အခါ တစ်ရှူးစသည်ဖြင့် ပါးစပ်နှာခေါင်းကို အုပ်ပါ

လက်ကို မကြာခဏဆေးပါ

- ◆ လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် မကြာခဏဆေးကြောပါ။ အယ်လ်ကိုဟောဖြင့် ပိုးသတ်ပါ။
လက်မဆေးဘဲမျက်လုံးနှာခေါင်းပါးစပ်တို့ကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။

လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ထား

- ◆ ပုံမှန်လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ထားပေးပါ။ ဘုံသုံးသောနေရာများနှင့် အခြားအခန်းများကိုလည်း တံခါးပေါက် ပြတင်းပေါက်များ လှစ်ဟထားပြီး လေဝင်လေထွက်လှည့်ပေးပါ။

လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ထိတွေ့သော အများသုံး ဘုံသုံးနေရာများကို ပိုးသတ်ပေးကြပါစို့

- ◆ အများသုံးဘုံသုံးနေရာအစိတ်အပိုင်းများ(တံခါးလက်ကိုင်ကွင်း၊ လက်ကိုင်လုံး၊ ကုတင်လက်ရန်းများစသည့်) အပြင်ဆိုင်တွေ့မှာရောင်းသော အိမ်သုံးကလိုရင်း အစွန်းချွတ်ဆေးကို ရေဖြင့်ရောကာ ပြင်းအား လျော့ပြီးမှ အများသုံးနေရာများကို သုတ်ပေးပါ။ ပြီးနောက်ရေပတ်တိုက်ပေးပါ။
 - ပစ္စည်းများတွင် ကပ်နေသောပိုးသည် အချိန်အတော်ကြာ ရှင်သန်နိုင်ပါသည်။
 - အိမ်သုံးကလိုရင်းပါသော အစွန်းချွတ်ဆေးတွင် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ပိုကလိုရိတ်ပါဝင်မှုကို စစ်ဆေးပြီး အသုံးပြုရမည့်ပြင်းအားကို လမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း လိုက်နာရေစပ်ပြီးမှ အသုံးပြုပါ။ (လမ်းညွှန်ချက် - ပြင်းအား: 0.05% ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ရဲ့ ပြင်းအားက 6% ဆိုပါက ရေ 3L တွင် ဆေး 25ml ရေစပ်ပါ)
- ◆ အိမ်သာနှင့် မျက်နှာသစ်ရောင်စင်တွင် ပုံမှန်အိမ်သုံး ဆပ်ပြာရည်ဖြင့်ဆေးကြောကာ အိမ်သုံးပိုးသတ်ဆေးရည် (အယ်လကိုဟော)ဖြင့် မကြာခဏဆေးကြောပိုးသတ်ပေးပါ။
 - သဘာဝ အဝတ်အစား၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊ တူ၊ ဇွန်း စသည်တို့ကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆပ်ပြာဖြင့်သေချာဆေးကြောပေးပါ။
 - ကူးစက်ခံရသူက အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများကို ခွဲခြားဆေးကြောရန် မလိုအပ်ပါ။
- ◆ မဆေးကြောရသေးသောပစ္စည်းများကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမပြုရပါ။
 - အထူးသဖြင့် သဘာဝအိမ်သာ၊ ရောင်စင်မီးဖိုချောင် စသည်တို့ကို မဆေးကြောဘဲ မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမပြုရန် သတိပြုပါ။

ညစ်ပေနေသောပိတ်အထည် အဝတ်အစားတို့ကိုလျှော့ဖွပ်ကြပါစို့

- ◆ ခန္ဓာကိုယ်မှစွန့်ပစ်အညစ်အကြေးများဖြင့်ပေရေနေသော အဝတ်အထည်တို့ကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် လက်အိတ် Mask ကိုဝတ်ဆင်ပြီး ပုံမှန် အိမ်သုံးဆပ်ပြာရည်ဖြင့်လျှော့ဖွပ်ပြီး လုံးဝခြောက်သွေ့အောင် ထားရပါမည်။
 - မစင်ထဲမှ ပိုးတွေ့တာမျိုးလဲရှိပါတယ်။

အမှိုက်ကိုသေချာ အလုံပိတ်၍ပစ်ပါ

- ◆ နှပ်ညစ်ထားသောတစ်ရှူးကို ချက်ချင်း ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲ ထည့်ပြီး အခန်းအပြင်သို့ ထုတ်သည့်အခါ သေချာအလုံပိတ်ပြီး စွန့်ပစ်ပြီး လက်ကိုဆပ်ပြာဖြင့်သေချာဆေးပါ။

• ကူးစက်ခံရသူကာယကံရှင်က အပြင်ထွက်ခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။

• မိသားစု အတူနေသူများကလည်း အဖျားတိုင်းခြင်းစသည်ဖြင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် အရေးမကြီးဘဲ အပြင်ထွက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း အထူးသဖြင့် ကိုယ်ပူ ချောင်းဆိုးလက္ခဏာများ ရှိသောအခါ အလုပ် မသွားပါနှင့် ။